سینوس پایلونیدال (کیست مویی) چیست؟

سینوس پایلونیدال بیماری شایع در انتهای ستون فقرات یا دنبالیچه است سینوس پایلونیدال به لحاظ ایجاد مزاحمت زیاد برای بیمار (ترشح در عفونت) و تحمیل هزینه های ناشی از مراقبت و طولانی بودن مدت غیبت از کار نیازمند توجه می باشد سینوس پایلونیدال کانال باریکی است که د ر انتهای آن سوراخ ترشح کننده ای در پوست پایین ترین نقطه ی پشت(بالای سوراخ مقعد) در خط وسط میان کپل ها ظاهر می شود این حفره اغلب حاوی مو بوده است.

این بیماری به چه دلیل ایجاد می شود؟

برگشت موبه داخل ناحیه ی انتهای ستون فقرات

زمینه ژنتیک (گاها بیماری درچند فرزند یک خانواده و یا پدرو فرزند مشاهده می شود).

این بیماری درآقایون چهاربرابرشایع ترازخانم ها می باشد از عوامل مستعد کننده این بیماری میتوان به چاقی، پوشیدن لباس های تنگ، وضعیت نشسته بیش از حد، سابقه ی مشکلات پوستی یا صدمه درآن ناحیه ، پرمو بودن پوست در این قسمت اشاره کرد.

علائم بیماری چگونه است؟

گاهی ممکن است یک توده بدون درد یا یک تورم در ناحیه فوق ایجاد گردد و بیمار در هنگام استحمام و شستشوی این ناحیه متوجه آن گردد.

-ترشح چرکی مزمن

-گاهی ترشح خونی از سوراخ های منفرد یا متعدد در خط وسط

ممکن است در سینوس آبسه ایجاد گردد در این صورت بیمار دچار تب، درد، تورم فزاینده در محل می گردد.

درمان بیماری چگونه است؟

درمان این بیماری حتما جراحی می باشد. تا زمانی که کیست حاوی مو با حاشیه ای از بافت سالم همراه آن برداشته نشود بیماری، خود را به صورت عودهای مکرر همراه با ترشح چرک و درد بروز می کند و بنابراین درمان داروئی جایگاهی در درمان سینوس موئی ندارد.

آمادگی های قبل از عمل:

جراح درصورتی که صلاح بداند قبل از عمل با متخصص بیهوشی و احیانا با متخصص قلب (در مورد افراد بالای چهل سال) مشورت می کند بیمار لازم است سابقه ی ابتلا به بیماری های قبلی و داروهایی که مصرف می کند را به پزشک اطلاع دهد.

قبل از عمل بایستی موهای ناحیه ی عمل کاملا شیو شود.

بیمار باید دوازده ساعت قبل از عمل ناشتا باشد.



مراقبت های بعد ازعمل:

قبل از ترخیص درمورد نحوه ی ادامه ی درمان، داروهای مورد نیاز، زمان مراجعه ی بعدی، نحوه ی استحمام، مدت استراحت، نحوه ی فعالیت های روزانه و نحوه ی پانسمان از جراح سوال نمایید.

موهای ناحیه ی عمل باید هرهفته از بین برده شوند.

روزانه یک نوبت محل عمل را با یک گازاستریل به خوبی خشک کنید.

بهداشت ناحیه ی عمل را رعایت کنید.

درصورتی که نشستن برای بیمار مشکل و با درد همراه باشد بایستی یک بالشتک که وسط آن سوراخ است تهیه وازآن استفاده نماید.

آدرس: تهران- بزرگراه یادگار امام شمال به جنوب، جنب مجتمع رفاهی دشت بهشت، خیابان قدوسی، بیمارستان فوق تخصصی عدل

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۶۵۸۸۰

وب سایت: adlhospital.ir

ADL HOSPITAL
بیمارستان فوق تخصصی عدل

سینوس پایلونیدال



گروه هدف: بزرگسالان

واحد آموزشی
بیمارستان فوق تخصصی عدل

پاییز ۱۴۰۰