

لیپوساکشن چیست؟

لیپوساکشن در واقع تخلیه چربیهای نامطلوب و اضافی توسط دستگاه مکنده از طریق سوراخهای کوچک و بدون برش جراحی است. در این روش چربیهای محل‌های ناخواسته مثل شکم، ران، باسن، بغل پا، زانو، بازو، چانه، گونه و گردن برداشته میشود. اکنون روش‌های جدیدی طی دهه اخیر ابداع شده اند که نتایج این عمل را به طور چشم گیری بهبود بخشیده است. البته لیپوساکشن هرگز جایگزین ورزش و رژیم نمی‌شود اما در داخل بدن ما نقاطی وجود دارند که چربی آن با ورزش و رژیم از بین نمی‌رود مانند پهلوها، کناره خارجی ران‌ها، بازو و... در این موارد تنها راه لیپوساکشن است.

باید انتظارات شما از لیپوساکشن واقعی باشد نه رویایی، باید بدانید که لیپوساکشن ظاهر شما را بهبود بخشیده و اعتماد به نفس شما را افزایش می‌دهد، اما ضرور تا بدان معنا نیست که کاملا با ایده آل شما مطابقت نماید

زمان عمل بسته به میزان چربی ساکشن شده از ۲ تا ۳ ساعت متغیر است.

مراقبت‌های بعد عمل

حال که عمل جراحی را با موفقیت پشت سر گذاشته اید، باید بدانید که مراقبت‌های بعد از عمل در نتیجه

نهایی نقش بسزائی دارند. این موضوع در روزها و هفته‌های اول اهمیت بیشتری می‌یابند.

توضیحات و توصیه‌های زیر به شما در امر کمک

می‌کند:

۱. بعد از اتمام لیپوساکشن باید هر چه زودتر از تخت پایین آمده و راه بروید. بعد از چند روز شما میتوانید فعالیت روزمره خود را از سر بگیرید. از فعالیت و ورزشهای سنگین تا ۱ ماه باید اجتناب شود.

۲. ۴۸ ساعت بعد از عمل می‌توانید دوش بگیرید.

۳. در دو روز اول، مدیریت درد و اجتناب از خطرات جراحی شکم در اولویت اصلی قرار دارد. بیمار در اولین هفته مشکلات بیشتری را دارد و این حالت ناراحتی در طول ۲ یا ۳ هفته به تدریج کاهش پیدا می‌کند. پس از چند هفته بازبایی توان حرکت و بدنسازی از اهمیت زیاد برخوردار خواهد بود. پس از چند ماه، شما می‌توانید نتایج حاصل از عمل جراحی زیبایی شکم را ارزیابی کنید. در این رابطه مهم است که به خاطر داشته باشید مدت زمان لازم برای ریکاوری در بین افراد مختلف به شدت متفاوت می‌باشد

۴. پرهیز از بیوست و کارکرد مختل روده‌ها ثانوی به بی حرکتی و اثرات بیهوشی: با مصرف مایعات فراوان و میوه و سبزیجات تازه و در صورت لزوم استفاده از ملین‌ها با نظر پزشک

۵. زمان برگشت به کار معمولا بین ۱ تا ۲ هفته پس از عمل است که جراح میتواند بسته به وضعیت جسمی و نوع کارتان، تخمین بهتری را ارائه دهد.

۶. در ساکشن شکم و پهلو برای کاستن از فشار روی محل ساکشن بهتر است در زمان خواب سرتان بالا باشد و چند بالش زیر زانوهایتان قرار دهید.

۷. بسیار مهم است که محاسبات برش‌های جراحی در حین التیام در معرض فشار، سائیدگی، یا حرکت قرار نگیرد. پزشک شما دستورالعمل‌های ویژه برای مراقبت را به شما آموزش خواهد داد. پس از عمل جراحی، یک لباس فشاری یا بانداژ الاستیک، ممکن است روی محل عمل بسته شود و لازم است ۳-۴ هفته استفاده نمایید، اینها به کنترل تورم و فشردن پوست به اندازه‌ی شکل جدید بدن کمک می‌نمایند.

۸. آناناس تازه (و نه کمپوت آن) حاوی ویتامین ث است که در تسریع جذب کبودی و ورم موثر است و هر چه بیشتر مصرف شود بهتر است. مصرف میوه جات، ماهی و میگو و امگا ۳ به وفور توصیه می‌شود.

۹. ویزیت هفته اول پزشک برای بررسی نتیجه عمل لازم است.

۱۰. تا ۱۵ روز مصرف نمک پس از عمل به حداقل کاهش داده شود.

۱۱. داروهای خود را طبق دستور پزشکتان تا آخر مصرف کنید.




هنگامی که به منزل می‌روید :

اگر احساس تنگی نفس، درد قفسه سینه، یا ضربان غیر طبیعی قلب را تجربه کردید و یا خونریزی از محل عمل داشتید، بلافاصله اطلاع دهید.

لیپوساکشن و مراقبت‌های بعد عمل

گروه هدف: بزرگسالان



واحد آموزشی

بیمارستان فوق تخصصی عدل

پاییز ۱۴۰۰



آدرس: تهران- بزرگراه یادگار امام شمال به جنوب، جنب مجتمع رفاهی دشت بهشت، خیابان قدوسی، بیمارستان فوق تخصصی عدل

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۶۵۸۸۰

وب سایت: adlhospital.ir

۱۲. مصرف دخانیات تا چند هفته پس از عمل ابدومینوپلاستی موجب تاخیر در بهبودی و افزایش عوارض می‌شود.

۱۳. ترشح خونابه تا چند روز پس از عمل جراحی زیبایی شکم طبیعی است. اما در صورت خونریزی واضح و قابل توجه اطلاع داده شود (این احتمال تا دو هفته بعد از عمل وجود دارد)

عوارض بعد از عمل

تمام اعمال جراحی ممکن است درجاتی از ریسک داشته باشند. گرچه بروز عوارض نادر است اما عوارضی نظیر عفونت، خونریزی (هماتوم)، و لخته‌های خونی ممکن است رخ دهد همچنین واکنش‌های آلرژیک به بیهوشی، عقونت، ترومبوآمبولی و آمبولی چربی، جوشگاه نامطلوب، تجمع مایع، اختلال در ترمیم زخم، از دست دادن پوست بیحسی یا سایر تغییرات حس پوست، مخاطرات بیهوشی، تغییر رنگ پوست و یا تورم طولانی مدت، مرگ بافت چربی عمیق پوست (نکروز چربی)، جداشدن زخم، ناقربینی، محو و شلی پوست، احساس درد و حساسیت (ممکن است چند هفته و گاهی تا دو سه ماه در موارد جراحی ابدو مینوپلاستی بطول بیانجامد)، ترومبوز ورید عمقی، عوارض قلبی و ریوی، تورم طولانیمدت پاهای، آسیب عصبی، احتمال نیاز به جراحی مجدد نتیجه کمتر از حد مطلوب از نظر زیبایی.